北京京剧院 2026 年职工体检项目
健康体检服务协议

甲方基本信息：

单位名称：北京京剧院

单位住所：北京市丰台区海户西里 30 号

邮编：100068

乙方基本信息：

单位名称：京东健康（北京）综合门诊部有限公司

单位住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 22 号院四区 4 号楼 1 层 101、102、2 层 201、202 室

邮编：100176

依据国家和北京市相关法律法规，经甲、乙、双方友好协商，约定乙方为甲方指定人员提供健康体检服务。甲、乙、双方在平等、自愿、互利的基础上，就健康体检的相关事宜达成如下协议：

第一条 体检时间和地点

1. 由甲乙双方共同协商体检时间，乙方在协商的时间

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

为甲方指定人员提供健康体检服务。

2. 合同期限：2026 年 10 月 21 日至 2026 年 12 月 31 日

3. 乙方提供体检服务的地点为： 北京

第二条 体检费用的计算和支付

1. 甲方根据自身实际情况选择相应的体检项目，确认后形成甲方参检人员的体检服务套餐，作为本协议的附件。

2. 本体检协议的费用：

男士 40 岁以上 2000 元/人，40 岁以下 1600 元/人；女士 40 岁以上 2100 元/人，40 岁以下 1900 元/人。

甲方本次体检现有人数总计为 521 人；其中男士 40 岁以上 130 人，40 岁以下 175 人；女士 40 岁以上 92 人，40 岁以下 124 人。体检金额总计： 人民币玖拾陆万捌仟捌佰元整（968800 元），最终金额以实际产生费用为准，体检套餐明细见附表。

3. 甲方参检人员家属体检同甲方参检人员体检项目和价格；前台临时加项的，乙方给予 5.5 折优惠，加项款前台支付。

4. 体检费用付款时间和方式：本次体检费用由甲方承担。体检实施前，甲方向乙方预付人民币伍拾万元整（500000 元）；

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

剩余费用待体检机构完整提交全部体检报告，且自报告提交之日起30个自然日内未出现误诊、漏诊、服务投诉等质量问题后支付。若在此期间出现误诊、漏诊、服务投诉等经核实属于乙方责任的问题，从剩余费用中扣除相当于体检总费用10%的金额作为违约金，并要求乙方承担相应的后续医疗费用。

5. 乙方结账汇款信息如下：

收款单位名称	京东健康（北京）综合门诊部有限公司
收款单位开户行名称	交通银行北京海淀支行
收款单位开户行账户	110060576018800106705
收款单位开户户名	京东健康（北京）综合门诊部有限公司
收款单位开户行银联号	

6. 甲方支付体检费用后，乙方根据付费金额提供增值税普通发票、体检人员费用明细等。

第三条 甲方权利与义务

1. 甲方须在体检前确认并告知乙方参检人员的所有体检服务项目，并就体检信息开放和隐私保护等问题与参检人员达成一致。

2. 甲方应配合乙方督促参检人员按时体检，若因甲方原因不能按时体检，应于体检前 10 日及时通知乙方调整体检时间。

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

3. 甲方应告知甲方参检人员严格遵守和执行体检时间，并协助乙方做好与体检服务和安排的相关事宜。

第四条 乙方权利和义务

1. 乙方应在甲方体检结束后 15 个工作日，按协议约定的体检项目，完成甲方参检人员体检的书面报告，同时提供线上和线下两种报告领取方式。

2. 乙方如发现实际参检人员与甲方提供的参检人员名单不一致，经征得甲方同意后，有权拒绝为其提供体检服务。

3. 乙方应在体检结束后将年度参检人员参检情况进行汇总分析，并将汇总分析报告反馈给甲方。

第五条 其他约定条款

1. 甲方参检人员未按协议约定而缺检或漏检的体检项目，视为甲方自行放弃，缺检、漏检项目费用不予退还；如已超过体检截止日期甲方还有人员未体检，甲乙双方可根据体检人数及体检项目商定补检。

2. 乙方为确保体检服务质量，原则上应安排 1-2 周的集中体检时间供甲方集中体检，并且所有体检场所均能提供包括 CT、核磁、骨密度检测等在内的所有项目检查。

3. 乙方应将参检人员体检报告、汇总情况以及需要立即进行进一步确诊或医学干预的紧急情况第一时间告知参

JDH2026A13024726
京东APP 扫码校验

检本人，向参检人员说明体检结果及相关健康情况，同时提交给甲方单位体检负责人或甲方指定的联系人。

4. 乙方承诺对甲方参检人员在体检过程中提供给乙方的基本信息及其体检结果和健康情况保密。

5. 体检服务质量的承诺：乙方提供的体检服务符合中国法律法规的要求，符合卫生部《健康体检管理暂行办法》和《北京市健康体检管理办法》的相关规定，也符合健康体检本身所能达到的一般性要求，并对健康检查的质量负责。在履行本协议过程中，若因乙方在提供的体检服务质量上引起甲方投诉，乙方应积极应对；但涉及医疗事故的，按照国家和北京现行法律法规和政策进行处理。

第六条 甲乙二方指定专人负责接洽本协议约定的体检、付款以及所有涉及体检事宜的联系安排。甲方联系人为：联系电话：马丽娜 联系电话：13552330118；乙方联系人为：杜许宁 联系电话：18600105044

第七条 体检潜在医疗风险的告知声明：

体检工作本身存在较大的诊疗风险，仅对疾病进行筛查，个人的个体差异很大，疾病的变化也各不相同，同时医学还有许多未被认识的领域。有些是能够预见但却无法完全避免和防范的。因此，在体检过程中双方对体检结果存在异议，乙方将进行复查。因甲方所选择体检项目的局限性致诊疗依

JDH2026A13024726
京东APP 扫码校验

据不足，不利于乙方做出疾病诊断或者由于乙方现有诊断技术所限而致意外，乙方不承担责任，但乙方会严格遵守各种规章制度和医疗操作规范，积极防范意外的发生。

第八条 协议变更补充和终止

1. 协议变更补充：协议如需补充、变更，经三方协商一致，可签订书面补充协议。补充协议作为本合同组成部分，具有同等法律效力。

2. 发生以下情形时，本协议终止：

(1) 双方履约结束，协议终止。

(2) 经双方协商一致，可以提前终止协议。

(3) 因不可抗力因素，造成双方或单方不能正常履约，协议终止。

3. 单方面解除协议：

（1）协议履行中，乙方无正当理由而停止向甲方继续提供服务时或乙方未经甲方同意擅自变更服务内容或提高收费标准、降低服务质量时，甲方有权单方解除合同，有预付体检费的，可要求乙方予以退还。

（2）协议履行中，甲方无正当理由而停止体检，并未按协议约定时间通知乙方，乙方有权单方解除协议，甲方预付体检费的，乙方不退还甲方预付体检费。

JDH2026A13024726

京东APP
扫码校验

第九条 争议解决方式

在本协议履行过程中发生争议，双方协商解决；协商不成时，任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，经双方签字并盖章后生效。

甲方（公章）：北京京剧院

法定代表人/授权代表人（签章）：

日期：2026 年 10 月 20 日

乙方（公章）：京东健康（北京）综合门诊部有限公司

法定代表人/授权代表人（签章）：

日期：2026 年 10 月 20 日

附件：体检套餐附表

1. 40 岁以下男士套餐

2. 40 岁以下女士套餐

3. 40 岁男士以上套餐（含 40 岁）

4. 40 岁以上女士套餐（含 40 岁）

JDH2026A13024726

京东APP 科技检验

40岁以下男士体检项目		
体检项目	**检查内容**	**临床意义**
一般检查	身高、体重、BMI、血压	通过仪器测量人体身高、体重、血压，科学判断体重是否标准、血压是否正常，并且为相关疾病的诊断提供重要的依据。
	腰围、臀围、腰臀比	腰臀比包括腰围、臀围及腰臀比值，腰围可以反映内脏脂肪堆积情况，内脏脂肪堆积是2型糖尿病和心血管病的危险因素。腰臀比值是判断中心性肥胖的重要指标。
内科检查	营养、面容、心脏、胸廓、肺部、腹部、肝脏、脾脏、外周血管、下肢浮肿	通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆，初步排查外周血管病变及下肢水肿等。
外科检查	皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门指诊、泌尿生殖系	通过体格检查，检查皮肤,浅表淋巴结,甲状腺,乳房,脊柱,四肢关节,肛门指诊,泌尿生殖系(男)等脏器基本情况，发现常见外科疾病的相关征兆，或初步排查外科常见疾病。
眼科	裂隙灯检查	通过裂隙灯、眼底镜检查瞳孔、角膜、虹膜、晶状体、玻璃体和眼底。
	非接触眼压计	诊断青光眼的检测方法。
	视力+色觉	视力是分辨物体的能力；色觉是视功能的基本而重要的组成部分。
	外眼检查	通过临床检查，检查外眼是否正常，发现或初步排除一些常见外眼疾病。
	眼底照相机	眼底照相可留存高达800万像素的高质量眼底照片，有助于细微眼底变化的诊断、对比、参照和院外会诊。
	眼底镜	眼底检查不仅可以诊断黄斑变性、视神经萎缩、眼底出血、渗出等眼底疾病，而且通过观察眼底血管的变化可有助于高血压、糖尿病、动脉硬化、肾炎和白血病等内科及全身疾病的诊断及合并症的防治。
耳鼻喉检查	耳鼻、口咽	通过对耳、鼻、咽、扁桃体的常规检查，初步筛查相关常见疾病。
口腔检查	牙体、牙周、口腔黏膜、颌面部	主要检查有无牙周病、牙结石、龋齿、缺牙等口腔疾病及颊面部、口腔部和颞颌关节等疾病。
心电图	静态心电图检查(ECG)	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。
核磁	头颅核磁平扫-MRI	即磁共振成像，主要用于检查脑部、脑血管及周围组织的结构或病变。无电离辐射，对软组织分辨率高，是神经系统疾病的重要诊断工具。
经颅多普勒	经颅多普勒（TCD）检查	以超声波多普勒效应进行颅内血管检测，无创伤和痛苦，了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支的血流情况，判断有无硬化、狭窄、缺血、畸形、痉挛等血管病变。可对脑血管疾病进行动态监测。
DR	DR颈椎侧位	查看椎体有无增生、先天性畸形、血管有无压迫、椎间狭窄、结核、肿物等。
CT	低剂量胸部CT平扫（不含片）	辅助诊断气管和肺部疾病、胸膜疾病以及纵隔疾病的主要检查方法，较胸部X光片检查有更高的灵敏度和准确度，比常规胸部CT检查使用的放射线剂量小，是体检筛查肺癌及肺结节的常用方法。
B超	腹部彩超（肝、胆、胰、脾、双肾）	对人体腹部内器官的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断、依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况、良恶性病变鉴别。

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

	颈动脉彩超	通过彩色超声检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变,为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。
	甲状腺彩超	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症；可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。
	泌尿系彩超（输尿管、膀胱、前列腺）	通过彩色超声仪器检查双肾、输尿管、膀胱、前列腺，对泌尿系疾病如肿块、结石及畸形有重要意义。
	前列腺彩超	观察前列腺形态，排查增生、钙化、结节、囊肿，与 PSA 互补判断
骨密度	骨密度检测	早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度，及时进行有效防治。
血常规	检查白细胞、中性粒细胞百分百、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞数、淋巴细胞数、中间细胞计数、红细胞、血红蛋白、红细胞积压、平均红细胞体积、平均血红蛋白量、平均血红蛋白浓度、红细胞分布宽度、血小板、血小板平均体积、红细胞分布宽度、血小板、血小板平均体积、血小板分布宽度、血小板容积	通过检测不同种类血液细胞及成分的数量和比例变化来辅助检查血液系统疾病和感染性疾病，如：贫血、感染、白血病、物理化学因素损伤等。
尿常规	尿胆原、胆红素、尿酮体、隐血、尿蛋白、亚硝酸盐、尿白细胞、尿糖、尿比重、酸碱度、维生素 C、镜检白细胞、镜检红细胞、镜检管型、镜检结晶	筛查泌尿系统疾病的常用方法。如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能，还可用于协助检查其他系统疾病，如糖尿病、肾炎等。
尿沉渣图像分析		通过显微镜或自动化设备观察尿液离心后的沉淀物，检测其中有形成分（如红细胞、白细胞、管型、结晶等）的形态、数量和类型，辅助诊断泌必尿系统疾病、感染、代谢异常等问题
肝功能十二项	天门冬氨酸氨基转移酶(AST)	增高：急性心梗、心肌炎、急慢性肝炎、急性胰腺炎等。
	丙氨酸氨基转移酶(ALT)	增高：急性肝炎、重症肝炎、阻塞性黄疸、肝癌等。
	γ-谷氨酰基转移酶(GGT)	增高：原发性和转移性肝癌、阻塞性黄疸、急性心梗等。
	总胆红素(T-Bil)	肝脏的分泌功能的指标，用于黄疸诊断，肝细胞性黄疸：三者均升高，溶血性黄疸：总胆红素升高，间接胆红素高度增加，直接胆红素正常或微增，阻塞性黄疸：总胆红素升高，直接胆红素高度增加，间接胆红素正常或微增。
	直接胆红素(D-Bil)	
	间接胆红素（I-Bil)	
	总蛋白(TP)	增高：高度失水、多发性骨髓瘤。
	白蛋白(Alb)	增高：少见，主要由于血流浓缩而致相对性增高，如严重脱水和休克等。降低：急性大量出血或严重灼伤时血浆大量丢失；肝脏合成白蛋白障碍，腹水形成时白蛋白丢失；肾脏疾病时，可随尿液丢失。
	球蛋白（GLB)	增高：肝硬化、结核、某些皮肤疾病；降低:引起体内球蛋白降低的疾病（少见）。

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

	白蛋白/球蛋白（A/G）	比例倒置：肝硬化、肾病综合征、慢性肝炎等。
	碱性磷酸酶（ALP）	增高：阻塞性黄疸、肝癌、肝炎、肾病、骨骼疾病　下降：VitD 过多，甲状旁腺功能减退。
	ALT/AST	ALT/AST 比值：医生用来判断是脂肪肝、酒精肝还是病毒性肝炎。
肾脏功能四项	尿素氮（BUN）	增高：急性肾小球肾炎、肾病晚期、肾功能衰竭等　降低：较少见，中毒性肝炎、肝硬化等。
	肌酐(Cr)	增高：严重肾功能不全、肾功能障碍、肢端肥大症　降低：营养不良、多尿。
	尿酸(UA)	增高:痛风、白血病、急性肾小球肾炎、重症肝病　降低：恶性贫血、乳糜泻、服用肾上腺皮质激素等。
	β2 微球蛋白检测(β2-MG)	增高：见于近端肾小管损害、自身免疫性疾病、恶性肿瘤、肝病、肾脏移植后的排斥反应、艾滋病等　减低：见于急性或慢性肾小球肾炎、肾病综合征等。
血糖测定	空腹血糖(Glu)	是筛查糖尿病的常用方法，有无糖尿病和低血糖，同时也是判断糖尿病病情和控制的主要指标。
	糖化血红蛋白(HbA1C)	反映近 2-3 个月的血糖变化情况,评价糖尿病控制程度；筛查糖尿病。预测微血管并发症。
血脂测定四项	总胆固醇(CHO)	增高：高脂血症、动脉粥样硬化、糖尿病肾病、甲状腺机能减退　降低：肠道吸收不良、肝病、甲亢、贫血、败血症、消耗性疾病。
	甘油三酯(TG)	增高：动脉粥样硬化、肾病综合症、糖尿病、原发性 TG 增多症等　降低：慢性阻塞性肺疾患、脑梗死、甲亢、营养不良。
	高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	HDL 的浓度与动脉粥样硬化综合征的发病率相关，所以检测血清中的 HDL 有助于防止罹患冠心病，而 HDL 浓度降低，尤其伴有甘油三脂浓度升高时，会增加心血管疾病的风险。
	低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)	低密度脂蛋白的胆固醇将存在于动脉粥样硬化的斑块中，对于评估罹患冠状动脉硬化综合征的风险，作为一个单独的指标，LDL 的浓度检测是最具有重要意义的指标。
甲状腺功能五项	促甲状腺激素(TSH)	主要用于原发/继发甲减及甲亢诊断。
	总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定	判断甲状腺功能，受甲状腺结合蛋白影响较大。
	总甲状腺素(T4)测定	诊断甲状腺功能，受甲状腺结合蛋白影响较大。
	游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定	甲亢和甲减的诊断、病情严重程度评估、疗效监测，临床型甲亢（T3 型甲亢）的指标 。
	游离甲状腺素(FT4)测定	甲亢和甲减的诊断，病情严重程度不同评估、疗效监测。
心血管检查	同型半胱氨酸(HCY)	为心血管疾病，尤其是冠状动脉粥样硬化和心肌梗塞的危险性评价指标，其浓度升高程度与疾病的危险性成正比。
	超敏 C 反应蛋白(hs-CRP)测定	一种高灵敏度的炎症指标，用于评估心血管疾病的风险。它能探测到血管系统内微弱的、长期的炎症状态，这种状态与动脉粥样硬化相关。
心肌损伤标志物	肌酸激酶 CK-MB 活性测定	主要用于评估心肌损伤，尤其是急性心肌梗死的诊断和鉴别诊断。肌酸激酶同工酶有有四种同工酶，其中肌酸激酶同工酶（CK-MB）主要分布于心肌中，CK-MB 对急性心肌梗死早期诊断的灵敏度和特异性最高。
	肌酸激酶(CK)测定定	化验肌酸激酶（CK）是通过检测血液中肌酸激酶的含量，评估肌肉、心脏或脑组织是否受损的检查。

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

	乳酸脱氢酶(LD)测定	乳酸脱氢酶广泛存在于人体各组织中，最多见于心肌、骨骼肌和红细胞。乳酸脱氢酶增高主要见于心肌梗死、急性或慢性肝炎、肝癌，也可见于骨骼肌疾病、血液系统疾病、肺梗死及晚期恶性肿瘤等。
	α羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测	主要反映心肌、肝脏、红细胞损伤
幽门螺旋(C13)检测	幽门螺杆菌抗体定性	阳性显示有幽门螺旋杆菌感染，与胃部炎症、消化道溃疡、胃癌的发生密切相关。
肿瘤标记物九项	甲胎蛋白(AFP)测定	对于原发性肝癌、胰腺癌、胃癌、肠癌、肺癌都具有较高人诊断意义，还可协助诊断肝炎、肝硬化等疾病。
	癌胚抗原(CEA)测定	系广谱肿瘤标志物，对于结肠癌、直肠癌、肺癌、乳腺癌的辅助诊断、判断预后、监测疗效及复发均有重要意义。
	糖类抗原 CA-199 测定	胰腺癌、胆道恶性肿瘤的诊断及胃肠道肿瘤诊断和治疗监测，卵巢癌和乳腺癌也有一定阳性率。
	总前列腺特异性抗原(TPSA)测定	前列腺癌的诊断及鉴别诊断。
	游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定	同时测 PSA 用于鉴别前列腺癌一良性前列腺肥大。
	FPSA/TPSA	
	细胞角蛋白 Cyfra211 测定	主要用于肺癌，特别是非小细胞肺癌的诊断、治疗监测和预后评估
	神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定	NSE 对神经母细胞瘤的诊断具有重要意义，常作为该病的重要辅助诊断指标，且其升高水平与肿瘤的分期和病情严重程度相关。
	糖类抗原 CA72-4 测定	对胃癌的诊断具有较高的特异性，是目前诊断胃癌较为敏感的肿瘤标志物之一
肠癌血液甲基化	血液 NTMT1/MAP3K14-AS1 甲基化	通过血液中 NTMT1 和 MAP3K14-AS1 基因甲基化水平，评估结直肠癌风险
中医问诊	心里评测	
减重-营养科	营养咨询	

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

40岁以上男士体检项目（含40岁）		
体检项目	**检查内容**	**临床意义**
一般检查	身高、体重、BMI、血压	通过仪器测量人体身高、体重、血压，科学判断体重是否标准、血压是否正常，并且为相关疾病的诊断提供重要的依据。
	腰围、臀围、腰臀比	腰臀比包括腰围、臀围及腰臀比值，腰围可以反映内脏脂肪堆积情况，内脏脂肪堆积是2型糖尿病和心血管病的危险因素。腰臀比值是判断中心性肥胖的重要指标。
内科检查	营养、面容、心脏、胸廓、肺部、腹部、肝脏、脾脏、外周血管、下肢浮肿	通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆，初步排查外周血管病变及下肢水肿等。
外科检查	皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门指诊、泌尿生殖系	通过体格检查，检查皮肤,浅表淋巴结,甲状腺,乳房,脊柱,四肢关节,肛门指诊,泌尿生殖系(男)等脏器基本情况，发现常见外科疾病的相关征兆，或初步排查外科常见疾病。
眼科	裂隙灯检查	通过裂隙灯、眼底镜检查瞳孔、角膜、虹膜、晶状体、玻璃体和眼底。
	非接触眼压计	诊断青光眼的检测方法。
	视力+色觉	视力是分辨物体的能力；色觉是视功能的基本而重要的组成部分。
	外眼检查	通过临床检查，检查外眼是否正常，发现或初步排除一些常见外眼疾病。
	眼底照相机	眼底照相可留存高达800万像素的高质量眼底照片，有助于细微眼底变化的诊断、对比、参照和院外会诊。
	眼底镜	眼底检查不仅可以诊断黄斑变性、视神经萎缩、眼底出血、渗出等眼底疾病，而且通过观察眼底血管的变化可有助于高血压、糖尿病、动脉硬化、肾炎和白血病等内科及全身疾病的诊断及合并症的防治。
耳鼻喉检查	耳鼻、口咽	通过对耳、鼻、咽、扁桃体的常规检查，初步筛查相关常见疾病。
口腔检查	牙体、牙周、口腔黏膜、颌面部	主要检查有无牙周病、牙结石、龋齿、缺牙等口腔疾病及颊面部、口腔部和颞颌关节等疾病。
心电图	静态心电图检查(ECG)	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。
CT	低剂量胸部CT平扫（不含片）	辅助诊断气管和肺部疾病、胸膜疾病以及纵隔疾病的主要检查方法，较胸部X光片检查有更高的灵敏度和准确度，比常规胸部CT检查使用的放射线剂量小，是体检筛查肺癌及肺结节的常用方法。
DR	DR颈椎侧位	查看椎体有无增生、先天性畸形、血管有无压迫、椎间狭窄、结核、肿物等。
核磁	头颅核磁平扫-MRI	即磁共振成像，主要用于检查脑部、脑血管及周围组织的结构或病变。无电离辐射，对软组织分辨率高，是神经系统疾病的重要诊断工具。
经颅多普勒	经颅多普勒（TCD）检查	以超声波多普勒效应进行颅内血管检测，无创伤和痛苦，了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支的血流情况，判断有无硬化、狭窄、缺血、畸形、痉挛等血管病变。可对脑血管疾病进行动态监测。
B超	腹部彩超（肝、胆、胰、脾、双肾）	对人体腹部内器官的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断、依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况、良恶性病变鉴别。
	颈动脉彩超	通过彩色超声检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变,为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

	甲状腺彩超	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症；可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。
	心脏彩超	通过超声波扫描技术检查心脏内部结构和血流变化，了解心脏各组成部分的形态以及功能状态，是心血管疾病的重要诊断方法。
	泌尿系彩超（输尿管、膀胱、前列腺）	通过彩色超声仪器检查双肾、输尿管、膀胱、前列腺，对泌尿系疾病如肿块、结石及畸形有重要意义。
	前列腺彩超	观察前列腺形态，排查增生、钙化、结节、囊肿，与 PSA 互补判断
	动脉硬化	可检测出受检者的血管年龄、下肢动脉狭窄或阻塞程度，血管的硬化程度以及心肌功能的状况。
骨密度	骨密度检测	早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度，及时进行有效防治。
类风湿因子（RF）测定	类风湿因子	是诊断类风湿关节炎的一个重要参考指标。这是一种针对自身组织的抗体，它的阳性结果常常提示身体可能存在风湿免疫系统方面的疾病。
血常规	检查白细胞、中性粒细胞百分百、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞数、淋巴细胞数、中间细胞计数、红细胞、血红蛋白、红细胞积压、平均红细胞体积、平均血红蛋白量、平均血红蛋白浓度、红细胞分布宽度、血小板、血小板平均体积、红细胞分布宽度、血小板、血小板平均体积、血小板分布宽度、血小板容积	通过检测不同种类血液细胞及成分的数量和比例变化来辅助检查血液系统疾病和感染性疾病，如：贫血、感染、白血病、物理化学因素损伤等。
补体两项	补体 C3,补体 C4	主要用于评估免疫系统功能，帮助诊断自身免疫性疾病（如系统性红斑狼疮）、感染性疾病及肾脏疾病等，反映机体炎症或免疫异常状态。
尿常规	尿胆原、胆红素、尿酮体、隐血、尿蛋白、亚硝酸盐、尿白细胞、尿糖、尿比重、酸碱度、维生素 C、镜检白细胞、镜检红细胞、镜检管型、镜检结晶	筛查泌尿系统疾病的常用方法。如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能，还可用于协助检查其他系统疾病，如糖尿病、肾炎等。
尿沉渣图像分析		通过显微镜或自动化设备观察尿液离心后的沉淀物，检测其中有形成分（如红细胞、白细胞、管型、结晶等）的形态、数量和类型，辅助诊断泌必尿系统疾病、感染、代谢异常等问题
肝功能十二项	天门冬氨酸氨基转移酶(AST)	增高：急性心梗、心肌炎、急慢性肝炎、急性胰腺炎等。
	丙氨酸氨基转移酶(ALT)	增高：急性肝炎、重症肝炎、阻塞性黄疸、肝癌等。
	γ-谷氨酰基转移酶(GGT)	增高：原发性和转移性肝癌、阻塞性黄疸、急性心梗等。
	总胆红素(T-Bil)	
	直接胆红素(D-Bil)	

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

	间接胆红素（I-Bil)	肝脏的分泌功能的指标，用于黄疸诊断，肝细胞性黄疸：三者均升高，溶血性黄疸：总胆红素升高，间接胆红素高度增加，直接胆红素正常或微增，阻塞性黄疸：总胆红素升高，直接胆红素高度增加，间接胆红素正常或微增。
	总蛋白(TP)	增高：高度失水、多发性骨髓瘤。
	白蛋白(Alb)	增高：少见，主要由于血流浓缩而致相对性增高，如严重脱水和休克等。降低：急性大量出血或严重灼伤时血浆大量丢失；肝脏合成白蛋白障碍，腹水形成时白蛋白丢失；肾脏疾病时，可随尿液丢失。
	球蛋白（GLB)	增高：肝硬化、结核、某些皮肤疾病；降低:引起体内球蛋白降低的疾病（少见）。
	白蛋白/球蛋白（A/G)	比例倒置：肝硬化、肾病综合征、慢性肝炎等。
	碱性磷酸酶（ALP)	增高：阻塞性黄疸、肝癌、肝炎、肾病、骨骼疾病　下降：VitD 过多，甲状旁腺功能减退。
	ALT/AST	ALT/AST 比值：医生用来判断是脂肪肝、酒精肝还是病毒性肝炎。
肾脏功能四项	尿素氮（BUN)	增高：急性肾小球肾炎、肾病晚期、肾功能衰竭等　降低：较少见，中毒性肝炎、肝硬化等。
	肌酐(Cr)	增高：严重肾功能不全、肾功能障碍、肢端肥大症　降低：营养不良、多尿。
	尿酸(UA)	增高:痛风、白血病、急性肾小球肾炎、重症肝病　降低：恶性贫血、乳糜泻、服用肾上腺皮质激素等。
	β2 微球蛋白检测(β2-MG)	增高：见于近端肾小管损害、自身免疫性疾病、恶性肿瘤、肝病、肾脏移植后的排斥反应、艾滋病等　减低：见于急性或慢性肾小球肾炎、肾病综合征等。
血糖测定	空腹血糖(Glu)	是筛查糖尿病的常用方法，有无糖尿病和低血糖，同时也是判断糖尿病病情和控制的主要指标。
	糖化血红蛋白(HbA1C)	反映近 2-3 个月的血糖变化情况,评价糖尿病控制程度；筛查糖尿病。预测微血管并发症。
血脂测定七项	总胆固醇(CHO)	增高：高脂血症、动脉粥样硬化、糖尿病肾病、甲状腺机能减退　降低：肠道吸收不良、肝病、甲亢、贫血、败血症、消耗性疾病。
	甘油三酯(TG)	增高：动脉粥样硬化、肾病综合症、糖尿病、原发性 TG 增多症等　降低：慢性阻塞性肺疾患、脑梗死、甲亢、营养不良。
	高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	HDL 的浓度与动脉粥样硬化综合征的发病率相关，所以检测血清中的 HDL 有助于防止罹患冠心病，而 HDL 浓度降低，尤其伴有甘油三脂浓度升高时，会增加心血管疾病的风险。
	低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)	低密度脂蛋白的胆固醇将存在于动脉粥样硬化的斑块中，对于评估罹患冠状动脉硬化综合征的风险，作为一个单独的指标，LDL 的浓度检测是最具有重要意义的指标。
	APOA1/APOB	预测冠心病、脑梗最强指标
	载脂蛋白 AⅠ(apoAⅠ)测定	载脂蛋白 A1 是高密度脂蛋白的主要结构蛋白,载脂蛋白 A1 可以反映血清中高密度脂蛋白的水平,和高密度脂蛋白胆固醇水平呈明显的正相关。
	载脂蛋白 B(apoB)测定	载脂蛋白 B 主要由肝脏组成,是低密度脂蛋白胆固醇的主要结构蛋白，可以直接反映低密度脂蛋白胆固醇的水平。
甲状腺功能五项	促甲状腺激素(TSH)	主要用于原发/继发甲减及甲亢诊断。
	总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定	判断甲状腺功能，受甲状腺结合蛋白影响较大。
	总甲状腺素(T4)测定	诊断甲状腺功能，受甲状腺结合蛋白影响较大。

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

	游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定	甲亢和甲减的诊断、病情严重程度评估、疗效监测，临床型甲亢（T3 型甲亢）的指标 。
	游离甲状腺素(FT4)测定	甲亢和甲减的诊断，病情严重程度不同评估、疗效监测。
心肌损伤标志物	肌酸激酶 CK-MB 活性测定	主要用于评估心肌损伤，尤其是急性心肌梗死的诊断和鉴别诊断。肌酸激酶同工酶有有四种同工酶，其中肌酸激酶同工酶（CK-MB）主要分布于心肌中，CK-MB 对急性心肌梗死早期诊断的灵敏度和特异性最高。
	肌酸激酶(CK)测定定	化验肌酸激酶（CK）是通过检测血液中肌酸激酶的含量，评估肌肉、心脏或脑组织是否受损的检查。
	乳酸脱氢酶(LD)测定	乳酸脱氢酶广泛存在于人体各组织中，最多见于心肌、骨骼肌和红细胞。乳酸脱氢酶增高主要见于心肌梗死、急性或慢性肝炎、肝癌，也可见于骨骼肌疾病、血液系统疾病、肺梗死及晚期恶性肿瘤等。
	α羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测	主要反映心肌、肝脏、红细胞损伤
心血管疾病筛查	血液流变学检查	通过检测血流动态变化，检测全血粘度等，提示血液粘滞性情况，对血管疾病人群尤为重要，是高血压、糖尿病、心脑血管疾病患者的一种辅助检查。
	超敏 C 反应蛋白(hs-CRP)测定	一种高灵敏度的炎症指标，用于评估心血管疾病的风险。它能探测到血管系统内微弱的、长期的炎症状态，这种状态与动脉粥样硬化相关。
心血管检查	同型半胱氨酸(Hcy)测定	高 Hcy 血症是体内叶酸和维生素 B12 缺乏的敏感指标，是心血管疾病的独立危险因素。升高提示易出现脑梗塞、脑出血、冠心病、动脉粥样硬化等疾病。
幽门螺旋(C13)检测	幽门螺杆菌抗体定性	阳性显示有幽门螺旋杆菌感染，与胃部炎症、消化道溃疡、胃癌的发生密切相关。
肿瘤标记物九项	甲胎蛋白(AFP)测定	对于原发性肝癌、胰腺癌、胃癌、肠癌、肺癌都具有较高人诊断意义，还可协助诊断肝炎、肝硬化等疾病。
	癌胚抗原(CEA)测定	系广谱肿瘤标志物，对于结肠癌、直肠癌、肺癌、乳腺癌的辅助诊断、判断预后、监测疗效及复发均有重要意义。
	糖类抗原 CA-199 测定	胰腺癌、胆道恶性肿瘤的诊断及胃肠道肿瘤诊断和治疗监测，卵巢癌和乳腺癌也有一定阳性率。
	总前列腺特异性抗原(TPSA)测定	前列腺癌的诊断及鉴别诊断。
	游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定	同时测 PSA 用于鉴别前列腺癌一良性前列腺肥大。
	FPSA/TPSA	
	细胞角蛋白 Cyfra211 测定	主要用于肺癌，特别是非小细胞肺癌的诊断、治疗监测和预后评估
	神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定	NSE 对神经母细胞瘤的诊断具有重要意义，常作为该病的重要辅助诊断指标，且其升高水平与肿瘤的分期和病情严重程度相关。
	糖类抗原 CA72-4 测定	对胃癌的诊断具有较高的特异性，是目前诊断胃癌较为敏感的肿瘤标志物之一
肠癌血液甲基化	血液 NTMT1/MAP3K14-AS1 甲基化	通过血液中 NTMT1 和 MAP3K14-AS1 基因甲基化水平，评估结直肠癌风险
中医问诊	心里评测	
减重-营养科	营养咨询	

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

40岁以下女士体检项目		
体检项目	**检查内容**	**临床意义**
一般检查	身高、体重、BMI、血压	通过仪器测量人体身高、体重、血压，科学判断体重是否标准、血压是否正常，并且为相关疾病的诊断提供重要的依据。
	腰围、臀围、腰臀比	腰臀比包括腰围、臀围及腰臀比值，腰围可以反映内脏脂肪堆积情况，内脏脂肪堆积是2型糖尿病和心血管病的危险因素。腰臀比值是判断中心性肥胖的重要指标。
内科检查	营养、面容、心脏、胸廓、肺部、腹部、肝脏、脾脏、外周血管、下肢浮肿	通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆，初步排查外周血管病变及下肢水肿等。
外科检查	皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门指诊、泌尿生殖系	通过体格检查，检查皮肤,浅表淋巴结,甲状腺,乳房,脊柱,四肢关节,肛门指诊,泌尿生殖系(男)等脏器基本情况，发现常见外科疾病的相关征兆，或初步排查外科常见疾病。
眼科	裂隙灯检查	通过裂隙灯、眼底镜检查瞳孔、角膜、虹膜、晶状体、玻璃体和眼底。
	非接触眼压计	诊断青光眼的检测方法。
	视力+色觉	视力是分辨物体的能力；色觉是视功能的基本而重要的组成部分。
	外眼检查	通过临床检查，检查外眼是否正常，发现或初步排除一些常见外眼疾病。
	眼底照相机	眼底照相可留存高达800万像素的高质量眼底照片，有助于细微眼底变化的诊断、对比、参照和院外会诊。
	眼底镜	眼底检查不仅可以诊断黄斑变性、视神经萎缩、眼底出血、渗出等眼底疾病，而且通过观察眼底血管的变化可有助于高血压、糖尿病、动脉硬化、肾炎和白血病等内科及全身疾病的诊断及合并症的防治。
耳鼻喉检查	耳鼻、口咽	通过对耳、鼻、咽、扁桃体的常规检查，初步筛查相关常见疾病。
口腔检查	牙体、牙周、口腔黏膜、颌面部	主要检查有无牙周病、牙结石、龋齿、缺牙等口腔疾病及颊面部、口腔部和颞颌关节等疾病。
心电图	静态心电图检查(ECG)	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。
核磁	头颅核磁平扫-MRI	即磁共振成像，主要用于检查脑部、脑血管及周围组织的结构或病变。无电离辐射，对软组织分辨率高，是神经系统疾病的重要诊断工具。
经颅多普勒	经颅多普勒（TCD）检查	以超声波多普勒效应进行颅内血管检测，无创伤和痛苦，了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支的血流情况，判断有无硬化、狭窄、缺血、畸形、痉挛等血管病变。可对脑血管疾病进行动态监测。
DR	DR颈椎侧位	查看椎体有无增生、先天性畸形、血管有无压迫、椎间狭窄、结核、肿物等。
CT	低剂量胸部CT平扫（不含片）	辅助诊断气管和肺部疾病、胸膜疾病以及纵隔疾病的主要检查方法，较胸部X光片检查有更高的灵敏度和准确度，比常规胸部CT检查使用的放射线剂量小，是体检筛查肺癌及肺结节的常用方法。
B超	腹部彩超（肝、胆、胰、脾、双肾）	对人体腹部内器官的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断、依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况、良恶性病变鉴别。
	颈动脉彩超	通过彩色超声检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变,为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

	甲状腺彩超	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症；可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。
	乳腺彩超（女）	检查乳腺、发现乳腺结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。
	妇科彩超（经腹）（女未婚）	检查子宫、卵巢、输卵管形态结构及内部回声，筛查肌瘤、囊肿、肿瘤等病变，经腹部检查，需憋尿。
	妇科彩超（经阴）（女已婚）	检查子宫、卵巢、输卵管形态结构及内部回声，筛查肌瘤、囊肿、肿瘤等病变，经阴道检查，无需憋尿。
	泌尿系统腺彩超	通过无创超声成像，检查双肾、输尿管、膀胱，评估脏器大小、内部结构，筛查肾囊肿、肾结石、肾积水、膀胱结石、膀胱壁病变、前列腺增生及钙化等泌尿系统器质性病变，为血尿、尿频、肾功能异常等提供形态学依据
骨密度	骨密度检测	早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度，及时进行有效防治。
血常规	检查白细胞、中性粒细胞百分百、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞数、淋巴细胞数、中间细胞计数、红细胞、血红蛋白、红细胞积压、平均红细胞体积、平均血红蛋白量、平均血红蛋白浓度、红细胞分布宽度、血小板、血小板平均体积、红细胞分布宽度、血小板、血小板平均体积、血小板分布宽度、血小板容积	通过检测不同种类血液细胞及成分的数量和比例变化来辅助检查血液系统疾病和感染性疾病，如：贫血、感染、白血病、物理化学因素损伤等。
尿常规	尿胆原、胆红素、尿酮体、隐血、尿蛋白、亚硝酸盐、尿白细胞、尿糖、尿比重、酸碱度、维生素 C、镜检白细胞、镜检红细胞、镜检管型、镜检结晶	筛查泌尿系统疾病的常用方法。如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能，还可用于协助检查其他系统疾病，如糖尿病、肾炎等。
尿沉渣图像分析		通过显微镜或自动化设备观察尿液离心后的沉淀物，检测其中有形成分（如红细胞、白细胞、管型、结晶等）的形态、数量和类型，辅助诊断泌必尿系统疾病、感染、代谢异常等问题
肝功能十二项	天门冬氨酸氨基转移酶(AST)	增高：急性心梗、心肌炎、急慢性肝炎、急性胰腺炎等。
	丙氨酸氨基转移酶(ALT)	增高：急性肝炎、重症肝炎、阻塞性黄疸、肝癌等。
	γ-谷氨酰基转移酶(GGT)	增高：原发性和转移性肝癌、阻塞性黄疸、急性心梗等。
	总胆红素(T-Bil)	肝脏的分泌功能的指标，用于黄疸诊断，肝细胞性黄疸：三者均升高，溶血性黄疸：总胆红素升高，间接胆红素高度增加，直接胆红素正常或微增，阻塞性黄疸：总胆红素升高，直接胆红素高度增加，间接胆红素正常或微增。
	直接胆红素(D-Bil)	
	间接胆红素（I-Bil)	
	总蛋白(TP)	增高：高度失水、多发性骨髓瘤。
	白蛋白(Alb)	增高：少见，主要由于血流浓缩而致相对性增高，如严重脱水和休克等。降低：急性大量出血或严重灼伤时血浆大量丢失；肝脏合成白蛋白障碍，腹水形成时白蛋白丢失；肾脏疾病时，可随尿液丢失。
	球蛋白（GLB)	增高：肝硬化、结核、某些皮肤疾病；降低:引起体内球蛋白降低的疾病（少见）。
	白蛋白/球蛋白（A/G)	比例倒置：肝硬化、肾病综合征、慢性肝炎等。

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

	碱性磷酸酶（ALP）	增高：阻塞性黄疸、肝癌、肝炎、肾病、骨骼疾病　下降：VitD 过多，甲状旁腺功能减退。
	ALT/AST	ALT/AST 比值：医生用来判断是脂肪肝、酒精肝还是病毒性肝炎。
肾脏功能四项	尿素氮（BUN）	增高：急性肾小球肾炎、肾病晚期、肾功能衰竭等　　降低：较少见，中毒性肝炎、肝硬化等。
	肌酐(Cr)	增高：严重肾功能不全、肾功能障碍、肢端肥大症　　降低：营养不良、多尿。
	尿酸(UA)	增高:痛风、白血病、急性肾小球肾炎、重症肝病　　降低：恶性贫血、乳糜泻、服用肾上腺皮质激素等。
	β2 微球蛋白检测(β2-MG)	增高：见于近端肾小管损害、自身免疫性疾病、恶性肿瘤、肝病、肾脏移植后的排斥反应、艾滋病等　　减低：见于急性或慢性肾小球肾炎、肾病综合征等。
血糖测定	空腹血糖(Glu)	是筛查糖尿病的常用方法，有无糖尿病和低血糖，同时也是判断糖尿病病情和控制的主要指标。
	糖化血红蛋白(HbA1C)	反映近 2-3 个月的血糖变化情况,评价糖尿病控制程度；筛查糖尿病。预测微血管并发症。
血脂测定四项	总胆固醇(CHO)	增高：高脂血症、动脉粥样硬化、糖尿病肾病、甲状腺机能减退　　降低：肠道吸收不良、肝病、甲亢、贫血、败血症、消耗性疾病。
	甘油三酯(TG)	增高：动脉粥样硬化、肾病综合症、糖尿病、原发性 TG 增多症等　　降低：慢性阻塞性肺疾患、脑梗死、甲亢、营养不良。
	高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	HDL 的浓度与动脉粥样硬化综合征的发病率相关，所以检测血清中的 HDL 有助于防止罹患冠心病，而 HDL 浓度降低，尤其伴有甘油三脂浓度升高时，会增加心血管疾病的风险。
	低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)	低密度脂蛋白的胆固醇将存在于动脉粥样硬化的斑块中，对于评估罹患冠状动脉硬化综合征的风险，作为一个单独的指标，LDL 的浓度检测是最具有重要意义的指标。
甲状腺功能五项	促甲状腺激素(TSH)	主要用于原发/继发甲减及甲亢诊断。
	总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定	判断甲状腺功能，受甲状腺结合蛋白影响较大。
	总甲状腺素(T4)测定	诊断甲状腺功能，受甲状腺结合蛋白影响较大。
	游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定	甲亢和甲减的诊断、病情严重程度评估、疗效监测，临床型甲亢（T3 型甲亢）的指标 。
	游离甲状腺素(FT4)测定	甲亢和甲减的诊断，病情严重程度不同评估、疗效监测。
心血管检查	同型半胱氨酸(HCY)	为心血管疾病，尤其是冠状动脉粥样硬化和心肌梗塞的危险性评价指标，其浓度升高程度与疾病的危险性成正比。
	超敏 C 反应蛋白(hs-CRP)测定	一种高灵敏度的炎症指标，用于评估心血管疾病的风险。它能探测到血管系统内微弱的、长期的炎症状态，这种状态与动脉粥样硬化相关。
心肌损伤标志物	肌酸激酶 CK-MB 活性测定	主要用于评估心肌损伤，尤其是急性心肌梗死的诊断和鉴别诊断。肌酸激酶同工酶有有四种同工酶，其中肌酸激酶同工酶（CK-MB）主要分布于心肌中，CK-MB 对急性心肌梗死早期诊断的灵敏度和特异性最高。
	肌酸激酶(CK)测定定	化验肌酸激酶（CK）是通过检测血液中肌酸激酶的含量，评估肌肉、心脏或脑组织是否受损的检查。
	乳酸脱氢酶(LD)测定	乳酸脱氢酶广泛存在于人体各组织中，最多见于心肌、骨骼肌和红细胞。乳酸脱氢酶增高主要见于心肌梗死、急性或慢性肝炎、肝癌，也可见于骨骼肌疾病、血液系统疾病、肺梗死及晚期恶性肿瘤等。

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

	α羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测	主要反映心肌、肝脏、红细胞损伤
幽门螺旋(C13)检测	幽门螺杆菌抗体定性	阳性显示有幽门螺旋杆菌感染，与胃部炎症、消化道溃疡、胃癌的发生密切相关。
肿瘤标记物九项	甲胎蛋白(AFP)测定	对于原发性肝癌、胰腺癌、胃癌、肠癌、肺癌都具有较高人诊断意义，还可协助诊断肝炎、肝硬化等疾病。
	癌胚抗原(CEA)测定	系广谱肿瘤标志物，对于结肠癌、直肠癌、肺癌、乳腺癌的辅助诊断、判断预后、监测疗效及复发均有重要意义。
	糖类抗原 CA-199 测定	胰腺癌、胆道恶性肿瘤的诊断及胃肠道肿瘤诊断和治疗监测，卵巢癌和乳腺癌也有一定阳性率。
	糖类抗原 CA-125 测定	主要用于辅助诊断妇科肿瘤，常见于卵巢癌、乳腺癌等。
	糖类抗原 CA-153 测定	乳腺癌和转移乳腺癌的辅助诊断及其治疗监测，辅助诊断卵巢癌、肺癌等。
	细胞角蛋白 Cyfra211 测定	主要用于肺癌，特别是非小细胞肺癌的诊断、治疗监测和预后评估
	神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定	NSE 对神经母细胞瘤的诊断具有重要意义，常作为该病的重要辅助诊断指标，且其升高水平与肿瘤的分期和病情严重程度相关。
	糖类抗原 CA72-4 测定	对胃癌的诊断具有较高的特异性，是目前诊断胃癌较为敏感的肿瘤标志物之一
	鳞状细胞癌相关抗原（SCC）	鳞状细胞癌抗原(SCC)是一种特异性很好而且是最早用于诊断鳞癌的肿瘤标志物。对子宫颈癌有较高的诊断价值；还可以辅助诊断肺鳞癌、食管鳞癌、头颈癌、外阴癌、膀胱癌、肛管癌、皮肤癌等。
肠癌血液甲基化	血液 NTMT1/MAP3K14-AS1 甲基化	通过血液中 NTMT1 和 MAP3K14-AS1 基因甲基化水平，评估结直肠癌风险
妇科检查	妇科问诊	妇科问诊是妇科检查的重要前置环节，通过医生问询月经、孕产、白带、腹痛、避孕方式、既往妇科疾病等信息，判断受检者妇科健康风险并指导后续检查方案
	妇科内诊（阴道检查）	通过检查发现外阴皮肤有无异常；阴道有无出血、溃疡；宫颈有无充血和异常分泌物等；子宫有无异常；双侧附件有无肿块及压痛等。
	白带常规	白带检查可以了解阴道清洁度情况及妇科炎症，如：外阴阴道假丝酵母菌病、滴虫性阴道炎及性病等均具有重要的意义。
	乳头瘤病毒分型检测（28 型）（HPV28 分型）	用于检测人乳头瘤病毒（HPV）28 种亚型的医学检测手段，可明确感染的具体病毒类型，区分高危型（致癌风险）和低危型（非致癌风险），辅助评估宫颈癌等疾病风险。
	子宫颈抹片检查(液基超薄细胞检测,TCT)	筛查宫颈早期病变较先进的检测方法，同时还能发现部分微生物感染如假丝酵母菌、滴虫等。
中医问诊	心里评测	
减重-营养科	营养咨询	

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

40岁以上女士体检项目（含40岁）		
体检项目	**检查内容**	**临床意义**
一般检查	身高、体重、BMI、血压	通过仪器测量人体身高、体重、血压，科学判断体重是否标准、血压是否正常，并且为相关疾病的诊断提供重要的依据。
	腰围、臀围、腰臀比	腰臀比包括腰围、臀围及腰臀比值，腰围可以反映内脏脂肪堆积情况，内脏脂肪堆积是2型糖尿病和心血管病的危险因素。腰臀比值是判断中心性肥胖的重要指标。
内科检查	营养、面容、心脏、胸廓、肺部、腹部、肝脏、脾脏、外周血管、下肢浮肿	通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆，初步排查外周血管病变及下肢水肿等。
外科检查	皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门指诊、泌尿生殖系	通过体格检查，检查皮肤,浅表淋巴结,甲状腺,乳房,脊柱,四肢关节,肛门指诊,泌尿生殖系(男)等脏器基本情况，发现常见外科疾病的相关征兆，或初步排查外科常见疾病。
眼科	裂隙灯检查	通过裂隙灯、眼底镜检查瞳孔、角膜、虹膜、晶状体、玻璃体和眼底。
	非接触眼压计	诊断青光眼的检测方法。
	视力+色觉	视力是分辨物体的能力；色觉是视功能的基本而重要的组成部分。
	外眼检查	通过临床检查，检查外眼是否正常，发现或初步排除一些常见外眼疾病。
	眼底照相机	眼底照相可留存高达800万像素的高质量眼底照片，有助于细微眼底变化的诊断、对比、参照和院外会诊。
	眼底镜	眼底检查不仅可以诊断黄斑变性、视神经萎缩、眼底出血、渗出等眼底疾病，而且通过观察眼底血管的变化可有助于高血压、糖尿病、动脉硬化、肾炎和白血病等内科及全身疾病的诊断及合并症的防治。
耳鼻喉检查	耳鼻、口咽	通过对耳、鼻、咽、扁桃体的常规检查，初步筛查相关常见疾病。
口腔检查	牙体、牙周、口腔黏膜、颌面部	主要检查有无牙周病、牙结石、龋齿、缺牙等口腔疾病及颊面部、口腔部和颞颌关节等疾病。
心电图	静态心电图检查(ECG)	通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形，为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。
CT	低剂量胸部CT平扫（不含片）	辅助诊断气管和肺部疾病、胸膜疾病以及纵隔疾病的主要检查方法，较胸部X光片检查有更高的灵敏度和准确度，比常规胸部CT检查使用的放射线剂量小，是体检筛查肺癌及肺结节的常用方法。
DR	DR颈椎侧位	查看椎体有无增生、先天性畸形、血管有无压迫、椎间狭窄、结核、肿物等。
核磁	头颅核磁平扫-MRI	即磁共振成像，主要用于检查脑部、脑血管及周围组织的结构或病变。无电离辐射，对软组织分辨率高，是神经系统疾病的重要诊断工具。
经颅多普勒	经颅多普勒（TCD）检查	以超声波多普勒效应进行颅内血管检测，无创伤和痛苦，了解颅内及颅外各血管、脑动脉环血管及其分支的血流情况，判断有无硬化、狭窄、缺血、畸形、痉挛等血管病变。可对脑血管疾病进行动态监测。
B超	腹部彩超（肝、胆、胰、脾、双肾）	对人体腹部内器官的状况和各种病变（如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等）提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断、依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况、良恶性病变鉴别。
	颈动脉彩超	通过彩色超声检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等；早期发现动脉血管病变,为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

	甲状腺彩超	通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症；可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。
	心脏彩超	通过超声波扫描技术检查心脏内部结构和血流变化，了解心脏各组成部分的形态以及功能状态，是心血管疾病的重要诊断方法。
	乳腺彩超（女）	检查乳腺、发现乳腺结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。
	妇科彩超（经腹）（女未婚）	检查子宫、卵巢、输卵管形态结构及内部回声，筛查肌瘤、囊肿、肿瘤等病变，经腹部检查，需憋尿。
	妇科彩超（经阴）（女已婚）	检查子宫、卵巢、输卵管形态结构及内部回声，筛查肌瘤、囊肿、肿瘤等病变，经阴道检查，无需憋尿。
	泌尿系统腺彩超	通过无创超声成像，检查双肾、输尿管、膀胱，评估脏器大小、内部结构，筛查肾囊肿、肾结石、肾积水、膀胱结石、膀胱壁病变、前列腺增生及钙化等泌尿系统器质性病变，为血尿、尿频、肾功能异常等提供形态学依据
	动脉硬化	可检测出受检者的血管年龄、下肢动脉狭窄或阻塞程度，血管的硬化程度以及心肌功能的状况。
骨密度	骨密度检测	早期发现骨量减少及估计骨质疏松的程度，及时进行有效防治。
类风湿因子（RF）测定	类风湿因子	是诊断类风湿关节炎的一个重要参考指标。这是一种针对自身组织的抗体，它的阳性结果常常提示身体可能存在风湿免疫系统方面的疾病。
血常规	检查白细胞、中性粒细胞百分百、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞数、淋巴细胞数、中间细胞计数、红细胞、血红蛋白、红细胞积压、平均红细胞体积、平均血红蛋白量、平均血红蛋白浓度、红细胞分布宽度、血小板、血小板平均体积、红细胞分布宽度、血小板、血小板平均体积、血小板分布宽度、血小板容积	通过检测不同种类血液细胞及成分的数量和比例变化来辅助检查血液系统疾病和感染性疾病，如：贫血、感染、白血病、物理化学因素损伤等。
补体两项	补体 C3,补体 C4	主要用于评估免疫系统功能，帮助诊断自身免疫性疾病（如系统性红斑狼疮）、感染性疾病及肾脏疾病等，反映机体炎症或免疫异常状态。
尿常规	尿胆原、胆红素、尿酮体、隐血、尿蛋白、亚硝酸盐、尿白细胞、尿糖、尿比重、酸碱度、维生素 C、镜检白细胞、镜检红细胞、镜检管型、镜检结晶	筛查泌尿系统疾病的常用方法。如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能，还可用于协助检查其他系统疾病，如糖尿病、肾炎等。
尿沉渣图像分析		通过显微镜或自动化设备观察尿液离心后的沉淀物，检测其中有形成分（如红细胞、白细胞、管型、结晶等）的形态、数量和类型，辅助诊断泌必尿系统疾病、感染、代谢异常等问题
肝功能十二项	天门冬氨酸氨基转移酶(AST)	增高：急性心梗、心肌炎、急慢性肝炎、急性胰腺炎等。
	丙氨酸氨基转移酶(ALT)	增高：急性肝炎、重症肝炎、阻塞性黄疸、肝癌等。
	γ-谷氨酰基转移酶(GGT)	增高：原发性和转移性肝癌、阻塞性黄疸、急性心梗等。
	总胆红素(T-Bil)	

JDH2026A13024726

京东APP 扫码检验

	直接胆红素(D-Bil)	肝脏的分泌功能的指标，用于黄疸诊断，肝细胞性黄疸：三者均升高，溶血性黄疸：总胆红素升高，间接胆红素高度增加，直接胆红素正常或微增，阻塞性黄疸：总胆红素升高，直接胆红素高度增加，间接胆红素正常或微增。
	间接胆红素（I-Bil)	
	总蛋白(TP)	增高：高度失水、多发性骨髓瘤。
	白蛋白(Alb)	增高：少见，主要由于血流浓缩而致相对性增高，如严重脱水和休克等。降低：急性大量出血或严重灼伤时血浆大量丢失；肝脏合成白蛋白障碍，腹水形成时白蛋白丢失；肾脏疾病时，可随尿液丢失。
	球蛋白（GLB)	增高：肝硬化、结核、某些皮肤疾病；降低:引起体内球蛋白降低的疾病（少见）。
	白蛋白/球蛋白（A/G)	比例倒置：肝硬化、肾病综合征、慢性肝炎等。
	碱性磷酸酶（ALP)	增高：阻塞性黄疸、肝癌、肝炎、肾病、骨骼疾病　下降：VitD 过多，甲状旁腺功能减退。
	ALT/AST	ALT/AST 比值：医生用来判断是脂肪肝、酒精肝还是病毒性肝炎。
肾脏功能四项	尿素氮（BUN)	增高：急性肾小球肾炎、肾病晚期、肾功能衰竭等　降低：较少见，中毒性肝炎、肝硬化等。
	肌酐(Cr)	增高：严重肾功能不全、肾功能障碍、肢端肥大症　降低：营养不良、多尿。
	尿酸(UA)	增高:痛风、白血病、急性肾小球肾炎、重症肝病　降低：恶性贫血、乳糜泻、服用肾上腺皮质激素等。
	β2 微球蛋白检测(β2-MG)	增高：见于近端肾小管损害、自身免疫性疾病、恶性肿瘤、肝病、肾脏移植后的排斥反应、艾滋病等　减低：见于急性或慢性肾小球肾炎、肾病综合征等。
血糖测定	空腹血糖(Glu)	是筛查糖尿病的常用方法，有无糖尿病和低血糖，同时也是判断糖尿病病情和控制的主要指标。
	糖化血红蛋白(HbA1C)	反映近 2-3 个月的血糖变化情况,评价糖尿病控制程度；筛查糖尿病。预测微血管并发症。
血脂测定七项	总胆固醇(CHO)	增高：高脂血症、动脉粥样硬化、糖尿病肾病、甲状腺机能减退　降低：肠道吸收不良、肝病、甲亢、贫血、败血症、消耗性疾病。
	甘油三酯(TG)	增高：动脉粥样硬化、肾病综合症、糖尿病、原发性 TG 增多症等　降低：慢性阻塞性肺疾患、脑梗死、甲亢、营养不良。
	高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)	HDL 的浓度与动脉粥样硬化综合征的发病率相关，所以检测血清中的 HDL 有助于防止罹患冠心病，而 HDL 浓度降低，尤其伴有甘油三脂浓度升高时，会增加心血管疾病的风险。
	低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)	低密度脂蛋白的胆固醇将存在于动脉粥样硬化的斑块中，对于评估罹患冠状动脉硬化综合征的风险，作为一个单独的指标，LDL 的浓度检测是最具有重要意义的指标。
	APOA1/APOB	预测冠心病、脑梗最强指标
	载脂蛋白 A I (apoA I)测定	载脂蛋白 A1 是高密度脂蛋白的主要结构蛋白,载脂蛋白 A1 可以反映血清中高密度脂蛋白的水平,和高密度脂蛋白胆固醇水平呈明显的正相关。
	载脂蛋白 B(apoB)测定	载脂蛋白 B 主要由肝脏组成,是低密度脂蛋白胆固醇的主要结构蛋白，可以直接反映低密度脂蛋白胆固醇的水平。
甲状腺功能五项	促甲状腺激素(TSH)	主要用于原发/继发甲减及甲亢诊断。
	总三碘甲状腺原氨酸(T3)测定	判断甲状腺功能，受甲状腺结合蛋白影响较大。
	总甲状腺素(T4)测定	诊断甲状腺功能，受甲状腺结合蛋白影响较大。

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

	游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定	甲亢和甲减的诊断、病情严重程度评估、疗效监测，临床型甲亢（T3 型甲亢）的指标 。
	游离甲状腺素(FT4)测定	甲亢和甲减的诊断，病情严重程度不同评估、疗效监测。
心血管检查	同型半胱氨酸(HCY)	为心血管疾病，尤其是冠状动脉粥样硬化和心肌梗塞的危险性评价指标，其浓度升高程度与疾病的危险性成正比。
心肌损伤标志物	肌酸激酶 CK-MB 活性测定	主要用于评估心肌损伤，尤其是急性心肌梗死的诊断和鉴别诊断。肌酸激酶同工酶有有四种同工酶，其中肌酸激酶同工酶（CK-MB）主要分布于心肌中，CK-MB 对急性心肌梗死早期诊断的灵敏度和特异性最高。
	肌酸激酶(CK)测定定	化验肌酸激酶（CK）是通过检测血液中肌酸激酶的含量，评估肌肉、心脏或脑组织是否受损的检查。
	乳酸脱氢酶(LD)测定	乳酸脱氢酶广泛存在于人体各组织中，最多见于心肌、骨骼肌和红细胞。乳酸脱氢酶增高主要见于心肌梗死、急性或慢性肝炎、肝癌，也可见于骨骼肌疾病、血液系统疾病、肺梗死及晚期恶性肿瘤等。
	α羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测	主要反映心肌、肝脏、红细胞损伤
心血管疾病筛查	血液流变学检查	通过检测血流动态变化，检测全血粘度等，提示血液粘滞性情况，对血管疾病人群尤为重要，是高血压、糖尿病、心脑血管疾病患者的一种辅助检查。
心脑血管病风险	超敏 C 反应蛋白(hs-CRP)测定	一种高灵敏度的炎症指标，用于评估心血管疾病的风险。它能探测到血管系统内微弱的、长期的炎症状态，这种状态与动脉粥样硬化相关。
幽门螺旋(C13)检测	幽门螺杆菌抗体定性	阳性显示有幽门螺旋杆菌感染，与胃部炎症、消化道溃疡、胃癌的发生密切相关。
肿瘤标记物九项	甲胎蛋白(AFP)测定	对于原发性肝癌、胰腺癌、胃癌、肠癌、肺癌都具有较高人诊断意义，还可协助诊断肝炎、肝硬化等疾病。
	癌胚抗原(CEA)测定	系广谱肿瘤标志物，对于结肠癌、直肠癌、肺癌、乳腺癌的辅助诊断、判断预后、监测疗效及复发均有重要意义。
	糖类抗原 CA-199 测定	胰腺癌、胆道恶性肿瘤的诊断及胃肠道肿瘤诊断和治疗监测，卵巢癌和乳腺癌也有一定阳性率。
	糖类抗原 CA-125 测定	主要用于辅助诊断妇科肿瘤，常见于卵巢癌、乳腺癌等。
	糖类抗原 CA-153 测定	乳腺癌和转移乳腺癌的辅助诊断及其治疗监测，辅助诊断卵巢癌、肺癌等。
	细胞角蛋白 Cyfra211 测定	主要用于肺癌，特别是非小细胞肺癌的诊断、治疗监测和预后评估
	神经元特异性烯醇化酶（NSE）测定	NSE 对神经母细胞瘤的诊断具有重要意义，常作为该病的重要辅助诊断指标，且其升高水平与肿瘤的分期和病情严重程度相关。
	糖类抗原 CA72-4 测定	对胃癌的诊断具有较高的特异性，是目前诊断胃癌较为敏感的肿瘤标志物之一
	鳞状细胞癌相关抗原（SCC）	鳞状细胞癌抗原(SCC)是一种特异性很好而且是最早用于诊断鳞癌的肿瘤标志物。对子宫颈癌有较高的诊断价值；还可以辅助诊断肺鳞癌、食管鳞癌、头颈癌、外阴癌、膀胱癌、肛管癌、皮肤癌等。
肠癌血液甲基化	血液 NTMT1/MAP3K14-AS1 甲基化	通过血液中 NTMT1 和 MAP3K14-AS1 基因甲基化水平，评估结直肠癌风险
妇科检查	妇科问诊	妇科问诊是妇科检查的重要前置环节，通过医生问询月经、孕产、白带、腹痛、避孕方式、既往妇科疾病等信息，判断受检者妇科健康风险并指导后续检查方案
	妇科内诊（阴道检查）	通过检查发现外阴皮肤有无异常；阴道有无出血、溃疡；宫颈有无充血和异常分泌物等；子宫有无异常；双侧附件有无肿块及压痛等。

JDH2026A13024726

京东APP 扫码校验

	白带常规	白带检查可以了解阴道清洁度情况及妇科炎症，如：外阴阴道假丝酵母菌病、滴虫性阴道炎及性病等均具有重要的意义。
	乳头瘤病毒分型检测（28型）（HPV28分型）	用于检测人乳头瘤病毒（HPV）28种亚型的医学检测手段，可明确感染的具体病毒类型，区分高危型（致癌风险）和低危型（非致癌风险），辅助评估宫颈癌等疾病风险。
	子宫颈抹片检查(液基超薄细胞检测,TCT)	筛查宫颈早期病变较先进的检测方法，同时还能发现部分微生物感染如假丝酵母菌、滴虫等。
中医问诊	心里评测	
减重-营养科	营养咨询	

JDH2026A13024726

京东APP
扫码校验